

Recomendação /

Escolha não efetuar endarterectomia carotídea/stenting carotídeo em doentes com estenose carotídea assintomática, de elevado risco cirúrgico e com esperança média de vida inferior a 5 anos.

Justificação /

A endarterectomia carotídea ou o stenting carotídeo não estão recomendados em doentes com estenose carotídea assintomática, de elevado risco cirúrgico e com esperança média de vida inferior a 5 anos. Nestes casos os riscos do procedimento superam os benefícios. A redução do risco do acidente vascular cerebral, após endarterectomia carotídea ou stenting carotídeo ocorre ao longo de vários anos. O tratamento deve dar prioridade ao controlo rigoroso dos fatores de risco cardiovascular, estilo de vida saudável, cessação tabágica, antiagregante e estatina.

—
A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente.

Bibliografia /

- ESVS 2023 Guidelines DOI: 10.1016/j.ejvs.2022.04.011

Uma recomendação de:

Colégio da Especialidade de Angiologia e Cirurgia Vascular da Ordem dos Médicos