

Recomendação /

Escolha não iniciar o ato anestésico em doentes com comorbilidades significativas sem uma avaliação pré-operatória apropriada realizada em tempo útil e com apoio pós-operatório adequado às suas necessidades.

Justificação /

A capacidade de prestar cuidados perioperatórios adequados aos doentes com comorbilidades significativas é um fator determinante para se obterem bons resultados clínicos. A avaliação pré-operatória deve ser adequada e oportuna para garantir todo o perioperatório num local capaz de prestar os cuidados necessários ao doente e ao procedimento a que este será sujeito. A existência no intra e pós-operatório de pessoal, equipamento e infraestruturas adequadas deve ser avaliada e planeada no pré-operatório.

—
A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente.

Bibliografia /

- Sankar A, Beattie WS, Wijesundera DN. How can we identify the high-risk patient? Current Opinion in Critical Care. 2015; 21(4):328-35.
- Minto G, Biccard B. Assessment of the high-risk perioperative patient. Continuing Education in Anaesthesia Critical Care & Pain. 2014; 14(1):12-7.
- Talmor D, Kelly B. How to better identify patients at high risk of postoperative complications? Current Opinion in Critical Care. 2017; 23(5):417-23.
- Aronson S, Mythen MG. Perioperative management of high-risk patients: Going beyond “avoid hypoxia and hypotension”. JAMA. 2017; 318(14):1330-2.

Recomendação original disponível em:

www.choosingwisely.org.au/recommendations/anzca

Uma recomendação de:

Colégio da Especialidade de Anestesiologia da Ordem dos Médicos

Recomendação subscrita por:

Colégio da Especialidade de Estomatologia da Ordem dos Médicos

