

Recomendação /

Escolha não adiar a referenciação por criptorquidia (testículo não descido) após os 6 meses de idade.

Justificação /

A idade ideal para a correção cirúrgica de um testículo não descido é entre os 6 e os 12 meses. A orquidopexia (fixação do testículo) não deve ser realizada antes dos 6 meses, porque os testículos podem ainda descer espontaneamente durante os primeiros meses de vida. A melhor evidência científica recomenda a realização de orquidopexia entre os 6 e os 12 meses. A intervenção cirúrgica dentro deste período pode otimizar a função espermatogénica.

—
A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente.

Bibliografia /

- Chan E, Wayne C, Nasr A; FRCS(C) for Canadian Association of Pediatric Surgeon Evidence-Based Resource. Ideal timing of orchiopexy: a systematic review. *Pediatr Surg Int.* 2014 Jan;30(1):87-97.
- Kim SO, Hwang EC, Hwang IS, Oh KJ, Jung SI, Kang TW, et al. Testicular catch up growth: the impact of orchiopexy age. *Urology.* 2011 Oct; 78(4):886-9.
- Kollin C, Karpe B, Hesser U, Granholm T, Ritzén EM. Surgical treatment of unilaterally undescended testes: testicular growth after randomization to orchiopexy at age 9 months or 3 years. *J Urol.* 2007 Oct;178(4 Pt 2):1589-93; discussion 1593.

Recomendação original disponível em:

<https://choosingwiselycanada.org/paediatric-surgery/>

Uma recomendação de:

Colégio da Especialidade de Cirurgia Pediátrica da Ordem dos Médicos

Recomendação subscrita por:

Colégio da Especialidade de Medicina Geral e Familiar da Ordem dos Médicos