

Recomendação

Escolha rastrear todos os utentes adultos para infecção por VIH independentemente da exposição.

Justificação

Todos as pessoas com idade entre os 18 e os 64 anos devem ser rastreadas para a infecção por VIH pelo menos uma vez. Este rastreio deve ser efectuado independentemente da exposição de risco, devendo ser repetido anualmente, independentemente da idade, em populações de risco acrescido para a infecção por VIH. Esta estratégia permitirá garantir um diagnóstico mais precoce da infecção por VIH, reduzindo o risco de complicações associadas ao diagnóstico tardio e com impacto significativo na transmissibilidade da infecção.

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente.

Bibliografia

- Direção Geral da Saúde. Diagnóstico e Rastreio Laboratorial da Infecção pelo Vírus da Imunodeficiência Humana (VIH). Norma nº 058/2011 atualizada a 10/12/2014.
- CDC. Revised recommendations for HIV testing of adults, adolescents, and pregnant women in health-care settings. MMWR 2006;55:1-17.

Uma recomendação de:

Colégio da Especialidade de Doenças Infecciosas da Ordem dos Médicos