

Recomendação

Escolha não administrar corticóides após traumatismo crânio-encefálico grave.

Justificação

Não se recomenda a administração de fármacos corticoesteróides para reduzir a pressão intracraniana ou melhorar o outcome em doentes com traumatismos crânio-encefálicos. O uso de corticóides em alta dose pode aumentar o risco de complicações e de mortalidade.

A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente.

Bibliografia

- Bratton SL, Chestnut RM, Ghajar J, McConnell Hammond FF, Harris OA, Hartl R, Manley GT, Nemecek A, Newell DW, Rosenthal G, Schouten J, Shutter L, Timmons SD, Ullman JS, Videtta W, Wilberger JE, Wright DW. Guidelines for the management of severe traumatic brain injury. XV. Steroids. J Neurotrauma. 2007;24 Suppl 1: S91–5.

Recomendação original disponível em:

<http://www.choosingwisely.org/societies/american-association-of-neurological-surgeons-and-congress-of-neurological-surgeons/>

Uma recomendação de:

Colégio da Especialidade de Neurocirurgia da Ordem dos Médicos