

## Recomendação

---

**Escolha não requisitar por rotina radiografias após imobilização gessada.**

## Justificação

---

Radiografias pós-imobilização de fraturas não deslocadas ou minimamente deslocadas que não sofrem manipulação antes ou durante a imobilização estão associadas a maior tempo de estadia na Urgência, exposição adicional a radiação ionizante e aumento dos custos com exames complementares, sem fornecer informações úteis adicionais. Embora certas circunstâncias exijam exames de imagem adicionais, a realização por rotina de radiografias pós-imobilização de fraturas não deslocadas ou minimamente deslocadas deve ser desencorajada.

*A informação apresentada nesta recomendação tem um propósito informativo e não substitui uma consulta com um médico. Caso tenha alguma dúvida sobre o conteúdo desta recomendação e a sua aplicabilidade no seu caso particular, deve consultar o seu médico assistente.*

## Bibliografia

- Chaudhry S, DelSole EM, Egol KA. Post-splinting radiographs of minimally displaced fractures: good medicine or medicolegal protection? J Bone Joint Surg Am. 2012 Sep 5;94(17):e128.
- Kjelle E, Andersen ER, Krokeide AM, Soril LJJ, van Bodegom-Vos L, Clement FM, Hofmann BM. Characterizing and quantifying low-value diagnostic imaging internationally: a scoping review. BMC Med Imaging. 2022 Apr 21;22(1):73.

## Uma recomendação de:

Colégio da Especialidade de Radiologia da Ordem dos Médicos